

УТВЕРЖДЕНО
Директором ГБПОУ Республики
Марий Эл «УОР» Н.В.Беткузиной
20 апреля 2021 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОП. 07 ОСНОВЫ И СПОСОБЫ ОКАЗАНИЯ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ

Цель: получение компетенций в области оказания первой помощи, необходимой для профессиональной деятельности специалистов спортивных и образовательных организаций, реализующих образовательные программы, работающих с различными возрастными группами населения.

В результате освоения учебной дисциплины слушатель курсов должен:

иметь практический опыт:

- Навыков простейших реанимационных мероприятий;
- Навыки оказания первой помощи при травмах, кровотечениях и состояниях, угрожающих жизни и здоровью человека;
- навыки психологической помощи пострадавшим обучающимся.

уметь:

- определять угрожающие факторы для жизни и здоровья пострадавших и окружающих; по возможности устранять данные факторы;
- применять различные способы оказания первой помощи в зависимости от состояния пострадавшего;
- использовать штатные (аптечки первой помощи) и подручные средства оказания первой помощи;
- вызывать скорую медицинскую помощь и иные специальные службы, передавать пострадавшего медицинским бригадам.

знать:

- организационно-правовые аспекты организации первой медицинской помощи, права и обязанности по оказанию первой помощи;
- состояния, при которых оказывается, первая помощь, ее основные мероприятия;
- последовательность действий на месте происшествия с наличием пострадавших (в зависимости от их состояния);
- внешние факторы, создающие опасности при оказании первой помощи.

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Учебная нагрузка слушателей	Объем в часах
Максимальная	16
Внеаудиторная самостоятельная	10
Обязательная аудиторная (онлайн и офлайн занятия):	6
в том числе: теоретические занятия (Google-класс, эл.почта)	4
практические занятия (онлайн-консультации)	2
Форма промежуточной аттестации: зачет	

Структура и содержание учебной дисциплины

Тема	Объем в часах	
	Аудиторные занятия	Внеаудиторная самостоятельная работа
Организационно-правовые аспекты оказания первой помощи	1	1
Первоочередные действия при оказании первой помощи	5	9
ВСЕГО	6	10

Комплект материалов для оценки освоения учебной дисциплины

№	Задания/Вопрос
1	<p align="center">Признаки артериального кровотечения</p> <p>Выберите один или несколько ответов:</p> <ol style="list-style-type: none">1. очень темный цвет крови2. алая кровь из раны вытекает фонтанирующей струей3. большое кровавое пятно на одежде или лужа крови возле пострадавшего4. над раной образуется валик из вытекающей крови5. кровь пассивно стекает из раны
2	<p align="center">Каким образом проводится сердечно-легочная реанимация пострадавшего?</p> <p>Выберите один ответ:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Давление руками на грудину пострадавшего и искусственная вентиляция легких: вначале 30 надавливаний на грудину, затем 2 вдоха методом «Рот ко рту»2. Искусственная вентиляция легких и давление руками на грудину пострадавшего: вначале 1 вдох методом «Рот ко рту», затем 15 надавливаний на грудину3. Давление руками на грудину пострадавшего и искусственная вентиляция легких: вначале 5 надавливаний на грудину, затем 1 вдох методом «Рот ко рту»
3	<p align="center">Вторым действием (вторым этапом) при оказании первой помощи является:</p> <p>Выберите один ответ:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Предотвращение возможных осложнений2. Устранение состояния, угрожающего жизни и здоровью пострадавшего3. Правильная транспортировка пострадавшего
4	<p align="center">Признаки венозного кровотечения</p> <p>Выберите один или несколько ответов:</p> <ol style="list-style-type: none">1. кровь пассивно стекает из раны2. над раной образуется валик из вытекающей крови3. очень темный цвет крови4. алая кровь из раны вытекает фонтанирующей струей
5	<p align="center">По каким признакам судят о наличии внутреннего кровотечения?</p> <p>Выберите один ответ:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Цвет кожных покровов, уровень артериального давления, сознание2. Пульс, высокая температура, судороги.3. Резкая боль, появление припухлости, потеря сознания
6	<p align="center">Кто может оказывать первую помощь пострадавшему ребенку?</p> <p>Выберите один ответ:</p> <ol style="list-style-type: none">1. только медицинский работник2. любой человек, который оказался рядом с пострадавшим ребенком3. любой человек, который оказался рядом с пострадавшим ребенком, при наличии специальной подготовки и (или) навыков
7	<p align="center">Разрешено ли давать пострадавшему лекарственные средства при оказании ему первой помощи?</p> <p>Выберите один ответ:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Разрешено2. Запрещено3. Разрешено в случае крайней необходимости
8	<p align="center">Куда накладываете кровоостанавливающий жгут на конечность при кровотечении?</p> <p>Выберите один ответ:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Непосредственно на рану.2. Ниже раны на 4-6 см.3. Выше раны на 4-6 см.

9	<p>При открытом переломе конечностей, сопровождающимся артериальным кровотечением, оказание первой помощи начинается:</p> <p>Выберите один ответ:</p> <ol style="list-style-type: none">1. С наложения импровизированной шины2. С наложения жгута выше раны на месте перелома3. С наложения давящей повязки
10	<p>Как оказывается первая помощь при переломах конечностей, если отсутствуют подручные средства для их изготовления?</p> <p>Выберите один ответ:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Верхнюю конечность, согнутую в локте, подвешивают на косынке и прибинтовывают к туловищу. Нижние конечности плотно прижимают друг к другу и прибинтовывают.2. Верхнюю конечность, вытянутую вдоль тела, прибинтовывают к туловищу. Нижние конечности прибинтовывают друг к другу, проложив между ними мягкую ткань.3. Верхнюю конечность, согнутую в локте, подвешивают на косынке и прибинтовывают к туловищу. Нижние конечности прибинтовывают друг к другу, обязательно проложив между ними мягкую ткань.
11	<p>Какие из перечисленных мероприятий относятся к оказанию первой помощи?</p> <p>Выберите один или несколько ответов:</p> <ol style="list-style-type: none">1. восстановление и поддержание проходимости дыхательных путей2. применение лекарственных препаратов3. выявление признаков травм, отравлений и других состояний, угрожающих жизни и здоровью4. передача пострадавшего бригаде скорой медицинской помощи5. сердечно-легочная реанимация6. определение признаков жизни у пострадавшего ребенка7. придание оптимального положения телу8. контроль состояния и оказание психологической поддержки9. временная остановка наружного кровотечения10. оценка обстановки и создание безопасных условий для оказания первой помощи11. вызов скорой медицинской помощи
12	<p>В каком порядке проводятся мероприятия первой помощи при ранении?</p> <p>Выберите один ответ:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Остановка кровотечения, наложение повязки2. Обеззараживание раны, наложение повязки, остановка кровотечения3. Остановка кровотечения, обеззараживание раны, наложение повязки
13	<p>О каких травмах у пострадавшего может свидетельствовать поза «лягушки» (ноги согнуты в коленях и разведены, а стопы развернуты подошвами друг к другу) и какую первую помощь необходимо при этом оказать?</p> <p>Выберите один ответ:</p> <ol style="list-style-type: none">1. У пострадавшего могут быть переломы костей голени и нижней трети бедра. При первой помощи наложить шины только на травмированную ногу от голеностопного до коленного сустава, не вытягивая ногу.2. У пострадавшего могут быть ушиб брюшной стенки, перелом лодыжки, перелом костей стопы. При первой помощи вытянуть ноги, наложить шины на обе ноги от голеностопного сустава до подмышки.3. У пострадавшего могут быть переломы шейки бедра, костей таза, перелом позвоночника, повреждение внутренних органов малого таза, внутреннее кровотечение. Позу ему не менять, ноги не вытягивать, шины не накладывать. При первой помощи подложить под колени валик из мягкой ткани, к животу по возможности приложить холод.

14	<p>В какой последовательности следует осматривать ребенка при его травмировании?</p> <p>Выберите один ответ:</p> <ol style="list-style-type: none">1. конечности, область таза и живот, грудная клетка, шея, голова2. голова, шея, грудная клетка, живот и область таза, конечности3. грудная клетка, живот и область таза, голова, шея, конечности
15	<p>В чем заключается первая помощь пострадавшему, находящемуся в сознании, при повреждении позвоночника?</p> <p>Выберите один ответ:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Пострадавшему, лежащему на спине, подложить под шею валик из одежды и приподнять ноги2. Лежащего пострадавшего не перемещать. Следует наложить ему на шею импровизированную шейную шину, не изменяя положения шеи и тела3. Уложить пострадавшего на бок
16	<p>Когда должен применяться непрямой массаж сердца?</p> <p>Выберите один ответ:</p> <ol style="list-style-type: none">1. при кровотечении2. при применении искусственного дыхания3. после освобождения пострадавшего от опасного фактора4. при повышении артериального давления5. при отсутствии пульса
17	<p>Что делать, если ребенок получил ожог пламенем, кипятком или паром?</p> <p>Выберите один или несколько ответов:</p> <ol style="list-style-type: none">1. вызвать скорую медицинскую помощь, до ее приезда наблюдать за ребенком и одновременно с этим охлаждать место ожога холодной проточной водой не менее 20 минут2. вызвать скорую медицинскую помощь, до ее приезда наблюдать за ребенком и одновременно с этим приложить холодный предмет к месту ожога, предварительно обернув его куском ткани3. вызвать скорую медицинскую помощь, до ее приезда наблюдать за ребенком
18	<p>Как проверить наличие дыхания у ребенка при внезапной потере сознания?</p> <p>Выберите один ответ:</p> <ol style="list-style-type: none">1. в течение 10 секунд внимательно смотреть на его грудную клетку2. наклониться к ребенку, приложить ухо к его грудной клетке и в течение 10 секунд прислушиваться3. запрокинуть голову ребенка, поднять подбородок, в течение 10 секунд прислушиваться, попытаться ощутить дыхание ребенка на своей щеке, увидеть дыхательные движения его грудной клетки
19	<p>Как следует уложить пострадавшего при потере им сознания и наличии пульса на сонной артерии для оказания первой помощи?</p> <p>Выберите один ответ:</p> <ol style="list-style-type: none">1. На спину с вытянутыми ногами2. Чтобы пострадавший не мог погнубнуть от удушения в результате западания языка, его следует положить на живот, чтобы вызвать рвотный рефлекс3. Чтобы пострадавший не мог погнубнуть от удушения в результате западания языка, его следует положить на бок так, чтобы согнутые колени опирались о землю, а верхняя рука находилась под щекой4. На спину с подложенным под голову валиком

20	<p style="text-align: center;">Признаки обморока</p> <p>Выберите один или несколько ответов:</p> <ol style="list-style-type: none">1. потере сознания предшествуют резкая слабость, головокружение, звон в ушах и потемнение в глазах2. кратковременная потеря сознания (не более 3-4 мин)3. потеря чувствительности4. потеря сознания более 6 мин
21	<p style="text-align: center;">Как проверить признаки сознания у ребенка?</p> <p>Выберите один ответ:</p> <ol style="list-style-type: none">1. аккуратно потормошить за плечи и громко спросить «Что случилось?»2. поводить перед ребенком каким-нибудь предметом и понаблюдать за движением его глаз3. спросить у ребенка, как его зовут
22	<p style="text-align: center;">В каком объеме проводятся мероприятия при прекращении сердечной деятельности и дыхания у пострадавшего?</p> <p>Выберите один ответ:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Освобождение дыхательных путей, проведение ИВЛ (искусственной вентиляции легких) и НМС (непрямого массажа сердца).2. Освобождение дыхательных путей, проведение ИВЛ (искусственной вентиляции легких)3. Проведение НМС (непрямого массажа сердца)
23	<p style="text-align: center;">При попадании в глаза щелочного раствора:</p> <p>Выберите один ответ:</p> <ol style="list-style-type: none">1. создать пострадавшему покой2. необходимо промыть глаза мыльным раствором3. необходимо промыть глаза проточной водой в большом количестве
24	<p style="text-align: center;">Как следует расположить руки на грудной клетке пострадавшего при давлении руками на его грудину (выполнении непрямого массажа сердца)?</p> <p>Выберите один ответ:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Основания ладоней обеих рук должны располагаться на грудной клетке на два пальца выше мечевидного отростка так, чтобы большой палец одной руки указывал в сторону левого плеча пострадавшего, а другой – в сторону правого плеча2. Основания ладоней обеих рук, которые накладываются одна на другую, должны располагаться на грудной клетке на два пальца выше мечевидного отростка так, чтобы большой палец одной руки указывал в сторону подбородка пострадавшего, а другой – в сторону живота3. Давление руками на грудину выполняют основанием ладони только одной руки, расположенной на грудной клетке на два пальца выше мечевидного отростка. Направление большого пальца не имеет значения.
25	<p style="text-align: center;">Перелом это</p> <p>Выберите один ответ:</p> <ol style="list-style-type: none">1. трещины, сколы, раздробление костей2. разрушение мягких тканей костей3. трещины, сколы, переломы ороговевших частей тела
26	<p style="text-align: center;">Действия по помощи пострадавшему при попадании инородного тела в дыхательные пути:</p> <p>Выберите один ответ:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Положить пострадавшего на бок и вызвать интенсивную рвоту.2. Нагнуть туловище пострадавшего вперед, нанести несколько интенсивных ударов ладонью между лопаток, при отсутствии эффекта — обхватить пострадавшего сзади, надавить 4-5 раз на верхнюю часть живота.3. Нанести пострадавшему, стоящему прямо, несколько интенсивных ударов ладонью между лопаток.


27	<p>Первая медицинская помощь при вывихе конечности?</p> <p>Выберите один ответ:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Зафиксировать конечность, не вправляя вывих, приложить пузырь (грелку) с горячей водой, организовать транспортировку в больницу или травмпункт2. Осуществить иммобилизацию конечности, дать доступные обезболивающие средства, приложить к поврежденному суставу пузырь с холодной водой или льдом, организовать транспортировку в больницу или травмпункт3. Дать обезболивающее средство, вправить вывих и зафиксировать конечность
28	<p>Каковы признаки кровотечения из крупной артерии и первая помощь при ее ранении?</p> <p>Выберите один ответ:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Одежда пропитывается кровью только в месте ранения (цвет крови не имеет значения), кровь вытекает из раны пассивно. Накладывается кровоостанавливающий жгут ниже места ранения не менее чем на 3-5 см.2. Одежда быстро пропитывается кровью, кровь темного цвета вытекает из раны пассивно. Накладывается давящая повязка на место ранения.3. Одежда пропитана кровью, кровь алого цвета вытекает из раны пульсирующей струей. Накладывается кровоостанавливающий жгут выше места ранения не менее чем на 3-5 см.
29	<p>Основные правила оказания первой помощи при травматическом шоке:</p> <p>Выберите один ответ:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Проведение мероприятий по прекращению действия травмирующих факторов. Восстановление нарушенного дыхания и сердечной деятельности, временная остановка кровотечения, борьба с болью, закрытие ран стерильными (чистыми) повязками, придание пострадавшему наиболее удобного положения, обеспечить приток свежего воздуха, организовать вызов к месту происшествия скорой медицинской помощи.2. Проведение мероприятий по прекращению действия травмирующих факторов. Снять одежду или ослабить ее давление. Дать понюхать нашатырный спирт. Наложить на лоб холодный компресс. Обеспечить приток свежего воздуха. Организовать вызов к месту происшествия скорой медицинской помощи.3. Уложить пострадавшего на спину. Дать понюхать нашатырный спирт. Наложить теплые примочки на лоб и затылок.
30	<p>При переломах костей конечностей накладывается шина:</p> <p>Выберите один ответ:</p> <ol style="list-style-type: none">1. ниже области перелома2. выше и ниже области перелома, так чтобы шина захватывала не менее двух ближайших суставов3. выше области перелома
31	<p>Какие предпринять меры при подозрении на отравление ребенка?</p> <p>Выберите один или несколько ответов:</p> <ol style="list-style-type: none">1. удалить поступивший яд (например, вызвать рвоту)2. вызвать скорую медицинскую помощь, до ее приезда наблюдать за ребенком, оказывая помощь при необходимости (например, при исчезновении признаков жизни приступить к сердечно-легочной реанимации)3. прекратить поступление ядовитого вещества в организм ребенка (вынести его из загазованной зоны, удалить жало насекомого, стереть ядовитое вещество с поверхности кожи и т. д.)
32	<p>Когда следует начинать сердечно-легочную реанимацию пострадавшего?</p> <p>Выберите один ответ:</p> <ol style="list-style-type: none">1. При наличии болей в области сердца и затрудненного дыхания2. При потере пострадавшим сознания, независимо от наличия пульса на сонной артерии, и признаков дыхания3. При потере пострадавшим сознания и отсутствии пульса на сонной артерии, а также признаков дыхания

33	<p>Как обеспечить восстановление и поддержание проходимости дыхательных путей пострадавшего при подготовке к проведению сердечно-легочной реанимации?</p> <p>Выберите один ответ:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Уложить пострадавшего на спину и, не запрокидывая ему голову, сжать щеки, чтобы раздвинуть губы и раскрыть рот. Очистить ротовую полость от слизи и рвотных масс.2. Уложить пострадавшего на бок, наклонить его голову к груди. Очистить ротовую полость от слизи и рвотных масс.3. Очистить ротовую полость от слизи и рвотных масс. Уложить пострадавшего на спину, запрокинуть ему голову, поднять подбородок и выдвинуть нижнюю челюсть.
34	<p>Как определить наличие пульса на сонной артерии пострадавшего?</p> <p>Выберите один ответ:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Большой палец руки располагают на шее под подбородком с одной стороны гортани, а остальные пальцы – с другой стороны2. Три пальца руки располагают с правой или левой стороны шеи на уровне щитовидного хряща гортани (кадыка) и осторожно продвигают вглубь шеи между щитовидным хрящом и ближайшей к хрящу мышцей3. Три пальца руки располагают с левой стороны шеи под нижней челюстью
35	<p>Какова первая помощь при черепно-мозговой травме, сопровождающейся ранением волосистой части головы?</p> <p>Выберите один ответ:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Наложить импровизированную шейную шину, на рану наложить стерильный ватный тампон, пострадавшего уложить на спину, приподняв ноги. По возможности к голове приложить холод.2. Наложить импровизированную шейную шину. К ране волосистой части головы приложить давящую повязку из стерильного бинта, пострадавшего уложить на бок с согнутыми в коленях ногами, по возможности к голове приложить холод.3. Шейную шину не накладывать, рану заклеить медицинским пластырем, пострадавшего уложить на бок только в случае потери им сознания
36	<p>При каких состояниях ребенка педагог может оказать ему первую помощь?</p> <p>Выберите один или несколько ответов:</p> <ol style="list-style-type: none">1. ожоги2. травмы различных областей тела3. инородные тела верхних дыхательных путей4. отморожения5. высокая температура6. отсутствие сознания7. отравление8. наружные кровотечения9. боли в животе10. остановка дыхания и кровообращения11. боли в груди
37	<p>Какова первая помощь при наличии признаков термического ожога второй степени (покраснение и отек кожи, образование на месте ожога пузырей, наполненных жидкостью, сильная боль)?</p> <p>Выберите один ответ:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Полить ожоговую поверхность холодной водой, накрыть стерильной салфеткой и туго забинтовать2. Вскрыть пузыри, очистить ожоговую поверхность от остатков одежды, накрыть стерильной салфеткой (не бинтовать), по возможности приложить холод, поить пострадавшего водой3. Пузыри не вскрывать, остатки одежды с обожженной поверхности не удалять, рану накрыть стерильной салфеткой (не бинтовать), по возможности приложить холод и поить пострадавшего водой
38	<p>При черепно-мозговой травме:</p> <p>Выберите один ответ:</p> <ol style="list-style-type: none">1. необходимо положить на голову тепло2. необходимо положить на голову холод3. необходимо наложить на голову марлевую повязку

39	<p>Что нужно делать при сильном кровотечении у ребенка в результате травмы до прибытия бригады скорой медицинской помощи?</p> <p>Выберите один или несколько ответов:</p> <ol style="list-style-type: none">1. если давящая повязка не помогает и кровотечение не останавливается, прижать артерию пальцем, наложить кровоостанавливающий жгут2. промыть рану, обработать ее, затем наложить салфетку, туго забинтовать3. наложить на рану салфетку, прижать, туго забинтовать4. обеспечить безопасные условия для оказания первой помощи
40	<p>Внезапно возникающая потеря сознания — это:</p> <p>Выберите один ответ:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Шок2. Мигрень3. Обморок
41	<p>При артериальном кровотечении наложенный жгут нельзя держать более:</p> <p>Выберите один ответ:</p> <ol style="list-style-type: none">1. 1 ч2. 30 мин3. 45 мин
42	<p>На какой срок может быть наложен кровоостанавливающий жгут?</p> <p>Выберите один ответ:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Не более получаса в теплое время года и не более одного часа в холодное время года2. Не более одного часа в теплое время года и не более получаса в холодное время года3. Время наложения жгута не ограничено
43	<p>Что делать, если ребенок подавился и не может дышать, говорить и кашлять?</p> <p>Выберите один или несколько ответов:</p> <ol style="list-style-type: none">1. если удары в спину и толчки в верхнюю часть живота не помогли, уложить ребенка на пол, проверить признаки дыхания, при их отсутствии – вызвать скорую медицинскую помощь и приступить к сердечно-легочной реанимации2. выполнить толчки в верхнюю часть живота (детям до года – в грудь) до 5 попыток, если традиционные удары по спине не помогли3. ударить по спине между лопатками (до 5 попыток), наклонив ребенка вперед
44	<p>Признаки переохлаждения</p> <p>Выберите один или несколько ответов:</p> <ol style="list-style-type: none">1. нет пульса у лодыжек2. посинение или побледнение губ3. озноб и дрожь4. нарушение сознания: заторможенность и апатия, бред и галлюцинации, неадекватное поведение5. снижение температуры тела6. потеря чувствительности
45	<p>Третьим действием (третьим этапом) при оказании первой помощи является:</p> <p>Выберите один ответ:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Предотвращение возможных осложнений2. Прекращение воздействия травмирующего фактора3. Правильная транспортировка пострадавшего
46	<p>К ушибленному месту необходимо приложить:</p> <p>Выберите один ответ:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Грелку2. Холод3. Спиртовой компресс
47	<p>При проведении ИВЛ (искусственной вентиляции легких) методом «рот в рот» необходимо:</p> <p>Выберите один ответ:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Зажимать нос пострадавшего только в случае, если носовые ходы свободны2. Нос пострадавшему не зажимать3. Свободной рукой плотно зажимать нос пострадавшего

Документ подписан электронной подписью.

48	При ушибах и растяжениях на поврежденное место накладывается: Выберите один ответ: 1. тепло 2. свободная повязка 3. холод
49	Первым действием (первым этапом) при оказании первой помощи является: Выберите один ответ: 1. Прекращение воздействия травмирующего фактора 2. Правильная транспортировка пострадавшего 3. Предотвращение возможных осложнений
50	Как остановить кровотечение при ранении вены и некрупных артерий? Выберите один ответ: 1. Наложить жгут ниже места ранения 2. Наложить давящую повязку на место ранения 3. Наложить жгут выше места ранения

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ		ПОДТВЕРЖДЕНА.
	ПОДЛИННОСТЬ ПРОВЕРЕНО В ПРОГРАММЕ КРИПТОАРМ.	
ПОДПИСЬ		
Общий статус подписи:	Подпись верна	
Сертификат:	4AA1D500B0ADC3A641DB39BA21C5866E	
Владелец:	1021200771646, 00204832281, 1215078802, 121521689394, sport-uor@yandex.ru, ГБПОУ РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ "УОР", ДИРЕКТОР, ГБПОУ РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ "УОР", Беткузина, Наталья Валерьевна, RU, ГОРОД ЙОШКАР-ОЛА, СЕЛО СЕМЕНОВКА, Республика Марий Эл, УЛИЦА МОЛОДЕЖНАЯ, 2	
Издатель:	ООО "КОМПАНИЯ "ТЕНЗОР", ООО "КОМПАНИЯ "ТЕНЗОР", Удостоверяющий центр, Московский проспект, д. 12, г. Ярославль, 76 Ярославская область, RU, 007605016030, 1027600787994, ca_tensor@tensor.ru	
Срок действия:	Действителен с: 27.09.2021 15:47:48 UTC+03 Действителен до: 27.12.2022 15:57:48 UTC+03	
Дата и время создания ЭП:	06.04.2022 12:02:54 UTC+03	